



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ 3872
วันที่ 1 พ.ค. 66
เวลา 10.47 น.

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข โทร ๐-๓๖๔๑-๔๑๐๕

ที่ ลบ ๕๑๐๐๖/พ/๕๒

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่
เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกส่วน

พร้อมบันทึกฉบับนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๒๖
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ เรียนมาเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และขอให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีต่อไป

(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กองสารนิเทศ
เลขที่รับ 1353
วันที่ 25 ต.ค 66
เวลา 11.30 น.



อบจ.ลพบุรี

☒ สำนักปลัด อบจ.	☐ กองยุทธศาสตร์
☐ สนง.เลขานุการ อบจ.	☐ กองการศึกษา
☐ กองคลัง	☐ หน่วยตรวจสอบ
☐ กองช่าง	☐ กองการเจ้าหน้าที่
☒ กองสารนิเทศ	

เลขที่รับ 6267
วันที่ 25 ต.ค 66
เวลา 11.30 น.

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช ลป ๑๕๐๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๑๘๔
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษ ผลกระทบของยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และประชาชนทั่วไปรู้เท่าทันยาเสพติดชนิดใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดส่งเอกสารการประชุมดังกล่าวและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์สนับสนุนการดำเนินงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์

จังหวัดลพบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่และสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแลทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพล อังคภากรณ์กุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๔๘ , ๐ ๓๖๗๗ ๐๒๒๕ ๖

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๑๘๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ ๑๑๒๐.๐๔/๓๕๕๑๒
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) แจ้งว่า ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษ ผลกระทบของยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และประชาชนทั่วไปรู้เท่าทันยาเสพติดชนิดใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดส่งเอกสารการประชุมดังกล่าวและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประโยชน์สนับสนุนการดำเนินงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่และสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดใหม่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายปวิตร เลิศอำไพพนนท์ โทร. ๐๒-๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒

0915



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 55673
วันที่ ๖ ต.ค. 2566
เวลา

ที่ ยธ ๑๑๒๐.๐๔/๓๕๕๖๖

สำนักงาน ป.ป.ส.

๕ ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

นพ.

๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ ๑๑๒๐.๐๔/๒๖๗๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้/สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษ ผลกระทบของยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และประชาชนทั่วไปรู้เท่าทันยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ส. และผ่าน Facebook live ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์สนับสนุนการดำเนินงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์)

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. รักษาการแทน วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๖
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เลขพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
เลขรับ 10492
วันที่ ๖ ต.ค. 2566
เวลา 14.04

ก.พ.ศ.
เลขรับ 2370

/วิค

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ - ๑๙ ต่อ ๒๕๐๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๘๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ itds.oncb@gmail.com



เอกสารประกอบการประชุม



สื่อการบรรยาย



"๑๓๒ ปี กระทรวงยุติธรรมก้าวต่อไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ"

QR Code ตามท้ายหนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ ยธ ๑๑๒๐.๐๔/๓๕๙๑๒
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยาย
เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่



เอกสารประกอบการประชุมฯ



สื่อการบรรยายฯ



ยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาด/ชนิดใหม่/ผสมผสานที่ตรวจพบ

โดย

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)



NATS



สถิติยาเสพติดของกลาง 6 ตัวยาหลักที่สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจพิสูจน์
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 (ต.ค. 65 - มิ.ย. 66)

ประเภทยาเสพติด	ปีงบประมาณ					
	2562	2563	2564	2565	2566 (ต.ค. 65 - มิ.ย. 66)	
ยาบ้า (ล้านเม็ด) (กิโลกรัม)	419.5 (40,406.9)	204.2 (19,502.0)	381.0 (35,303.6)	339.14 (31,419.7)	246.68 (22,389.7)	1
ไอซ์ (กิโลกรัม)	11,918.1	16,065.9	10,816.3	7,696.1	15,288.9	2
เฮโรอีน (กิโลกรัม)	806.9	354.0	3,280.7	508.3	777.3	4
โคเคน (กิโลกรัม)	31.3	21.7	21.3	25.3	8.7	6
ยาอี (เม็ด) (กิโลกรัม)	165,007 (64.5)	430,478 (182.5)	223,733 (120.1)	498,655 (198.3)	77,378 (61.0)	5
คีตามีน (กิโลกรัม)	976.47	842.33	1,829.6	1,230.1	2,253.6	3




NATS

ยาบ้า

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ.)

เม็ดยา

ตราประทับด้านเดียว



ตราประทับสองด้าน




ตราประทับส่วนมากที่พบเป็น WY
สีเม็ดยาส่วนมากเป็นสีส้มและสีเขียว
น้ำหนักโดยเฉลี่ย 90 มิลลิกรัม
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร
หนาประมาณ 2.5 มิลลิเมตร

ส่วนผสมของยาบ้า 1 เม็ด



รูปแบบการบรรจุ/หีบห่อ



1 มัด = 10 ซอง บรรจุซองละ 200 เม็ด = 2,000 เม็ด



ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566)

จากคดียาบ้าในคดีร้ายสำคัญ (ตั้งแต่ 10,000 เม็ด ขึ้นไป) ที่ส่งตรวจพิสูจน์ สวพ. จำนวน 121 คดี 353 ตัวอย่าง รวมจำนวน 246.68 ล้านเม็ด

พบตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ยาบ้า แบ่งได้จำนวน 5 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้

แบบ 1 ผนึกห่อแบบ "999" จำนวน 148.47 ล้านเม็ด (คิดเป็นร้อยละ 60.19) พบเป็นอันดับ 1

ตัวอย่างที่พบ



แบบ 2 ผนึกห่อแบบ "1-2" จำนวน 0.30 ล้านเม็ด (คิดเป็นร้อยละ 0.12)

ตัวอย่างที่พบ




แบบ 3 ผนึกห่อแบบ "Y1" จำนวน 38.80 ล้านเม็ด (คิดเป็นร้อยละ 15.73) พบเป็นอันดับ 3

ตัวอย่างที่พบ



แบบ 4 ผนึกห่อแบบ "ตราประทับอื่น ๆ" จำนวน 58.72 ล้านเม็ด (คิดเป็นร้อยละ 23.80) พบเป็นอันดับ 2

ตัวอย่างที่พบ



แบบ 5 ผนึกห่อแบบ "ไม่มีตราประทับ" จำนวน 0.39 ล้านเม็ด (คิดเป็นร้อยละ 0.16)

ตัวอย่างที่พบ




ไอซ์

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


รูปแบบการบรรจุ/หีบห่อ

ผลึก





- ❖ เป็นเมทแอมเฟตามีนที่มีความบริสุทธิ์สูง ~ 90 - 99 %
- ❖ ลักษณะเป็นผลึก คล้ายสารส้ม หรือน้ำตาลกรวด


กลุ่ม GUANYINWANG



กลุ่ม ALPHABET




ถุงชา ขนาดกว้างประมาณ 6 นิ้ว (1 ถุง = 1 กิโลกรัม)



1 ถุง/ซอง = 1 G = 0.6 กรัม

5-10 กรัม



เฮโรอีน


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ)

ผง



รูปแบบการบรรจุ/หีบห่อ



อัดเป็นแท่ง ขนาดแท่งประมาณ 4x6x1 นิ้ว
น้ำหนักแท่งละประมาณ 350 กรัม



ถุงพลาสติกใส ขนาดกว้างประมาณ 10 นิ้ว
น้ำหนักถุงละประมาณ 350 กรัม



โคเคน


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ.)

ผง



รูปแบบการบรรจุ/หีบห่อ



สวพ.
NATSI

คีตาหมื่น


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ.)


ผง/หีบ




ถุงชา ขนาดกว้างประมาณ 3.5 นิ้ว (1 ถุง = 1 กิโลกรัม)



1 สารเดี่ยว



2 สารผสม



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65 - มิ.ย.66) ตรวจพบคีตาหมื่นในยาเสพติดของกลาง 120 คดี

สวพ.
NATSI


คีตามีน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวท)

เคนมผง


พบในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ตรวจพบ คีตามีนผสมโคคาอีแนม



ซองละประมาณ 0.4 - 0.8 กรัม

ตรวจพบ คีตามีนผสมกาแฟีน



ซองละประมาณ 2 - 5 กรัม



ยาอี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน


แบบ Designer Drugs

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวท)

แบบเม็ด


ปี 2558 - 2556

% MDMA
ประมาณ 30-50



ปี 2557 - ปัจจุบัน

% MDMA
ประมาณ 10-65



แบบผง เกล็ด ผลึก

ปี 2558 - 2566

นำเข้าจากยุโรป




นำเข้าทางชายแดน
ภาคตะวันออกเจียงเหนือ




% MDMA มากกว่า 80

ปี 2564 - 2566



ปี 2565 - 2566



ยาอี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ)

แบบเม็ด

ทรงกลม

ทรงสี่เหลี่ยม

ทรงสามเหลี่ยม

อื่น ๆ



NATSI

ยาอี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แบบเม็ด

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ)

ยาอี ที่พบส่วนผสมอื่น นอกจาก MDMA ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สูตร 1

MDMA + Meth

MDMA + 2CB

Meth

สูตร 4

MDMA + Ket

สูตร 2

Meth + KET

MDMA + Meth + KET

สูตร 3

MDMA + Meth + KET + Nim




NATSI

ยาอี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวท)

แบบผง เกล็ด ผลึก



ผลึกสีขาวออกน้ำตาล พบช่วงความบริสุทธิ์ของ MDMA อยู่ในช่วงร้อยละ 87.88-99.71

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบจำนวน 8 คดี (น้ำหนัก 22,891.457 กรัม) พื้นที่เกิดเหตุ ดังนี้

- พื้นที่ กทม. จำนวน 4 คดี
- พื้นที่ สมุทรปราการ จำนวน 2 คดี
- พื้นที่ เพชรบูรณ์ จำนวน 1 คดี
- พื้นที่ สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คดี

สวท
NATS


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แบบ Designer Drugs

ซองกาแฟ/ซองครีมเทียม

ซองละประมาณ 15 - 20 กรัม

+Ketamine+Nimetazepam



+Metamphetamine+Nimetazepam



+Ketamine

+Nimetazepam - Caffeine



+Nimetazepam



-Caffeine



สูตร 1

สวท
NATS

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แบบ Designer Drugs

HAPPY WATER

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ.)

สูตร 1

1. +Ketamine +Nimetazepam (กบมก)
2. +Nimetazepam
3. +Ketamine Caffeine
4. +Amphetamine +Ketamine
5. +Metamphetamine +Ketamine +Nimetazepam +Caffeine
6. +Mephedrone +Ketamine +Nimetazepam +Heroin

สูตร 2

1. +Diazepam

สูตร 3

1. +Nimetazepam

NATS

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ.)

เห็ดขี้ควาย

ผลตรวจทางเคมี พบไซโลซีน และ ไซโลไซบิน


ซึ่งเป็นสารสำคัญในเห็ดขี้ควาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบ จำนวน 2 คดี

- มกราคม 2566 เกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ สน.โคกคราม กทม. เป็นพืชแห้งจำนวน 674 กรัม ผง จำนวน 14 แคปซูล น้ำหนักประมาณ 5.5 กรัม
- พฤษภาคม 2566 เกิดเหตุในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพืชแห้งจำนวน 396 กรัม ผง จำนวน 65 แคปซูล น้ำหนักประมาณ 11.9 กรัม (พบร่วมกับยาอี จำนวน ประมาณ 1,400 เม็ด และคีตาามีน

NATS

LSD



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบ จำนวน 2 คดี

- พฤศจิกายน 2565 เกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ สน.สุทธิสาร กทม. เป็นแผ่นกระดาษ จำนวน 22 แผ่น น้ำหนักประมาณ 0.369 กรัม
- ธันวาคม 2565 เกิดเหตุในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เป็นเป็นแผ่นกระดาษ จำนวน 2 แผ่น น้ำหนักประมาณ 0.034 กรัม (พบร่วมกับยาอี จำนวน 2 เม็ด และยาอีผง/ผลึก ประมาณ 26 กรัม และโคเคน

ผลตรวจทางเคมี
พบเดกซ์โทรแอมเฟตามีน

จบการนำเสนอ
ขอบคุณค่ะ



ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย



ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุขมะ
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี



สารเสพติด

- Substance abuse

สารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท นำไปสู่การติดสาร และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- Illicit Drugs

ยาที่ถูกผลิต ขนย้าย และใช้เสพอย่างผิดกฎหมาย (ดูตามกฎหมายระหว่างประเทศ)

DSM V Diagnostic Criteria: Substance Use Disorder**SEVERITY:** 2-3: *mild* 4-5: *moderate* 6 or more: *severe*

1. Taking the substance in larger amounts or for longer than you meant to.
2. Wanting to cut down or stop using the substance but not managing to do so.
3. Spending a lot of time getting, using, or recovering from use of the substance
4. Cravings and urges to use the substance
5. Not managing to do what you should at home, work, or school because of substance use
6. Continuing to use, even when it causes problems in relationships
7. Giving up important social, occupational, or recreational activities because of substance use
8. Using substances again and again, even when it puts you in danger
9. Continuing to use, even if you have a physical or psychological problem that could have been caused or made worse by the substance
- *10. Needing more of the substance to get the effect you want (tolerance)
- *11. Development of withdrawal symptoms, which can be relieved by taking more of the substance
- *Criteria not met if taking prescribed drugs under supervision

DSM V Diagnostic Criteria: Substance Use Disorder**SEVERITY:** 2-3: *mild* 4-5: *moderate* 6 or more: *severe*

1. Taking the substance in larger amounts or for longer than you meant to.
2. Wanting to cut down or stop using the substance but not managing to do so.
3. Spending a lot of time getting, using, or recovering from use of the substance
4. Cravings and urges to use the substance
5. Not managing to do what you should at home, work, or school because of substance use
6. Continuing to use, even when it causes problems in relationships
7. Giving up important social, occupational, or recreational activities because of substance use
8. Using substances again and again, even when it puts you in danger
9. Continuing to use, even if you have a physical or psychological problem that could have been caused or made worse by the substance
- *10. Needing more of the substance to get the effect you want (tolerance)
- *11. Development of withdrawal symptoms, which can be relieved by taking more of the substance
- *Criteria not met if taking prescribed drugs under supervision

ตรวจสอบสารเสพติดคนงานไซต์ก่อสร้างห้างพัทยา พบยาบ้าฉิมม่วง41ราย-ต่างดาวผิดกม.12ราย

ตรวจสอบสารเสพติดคนงานไซต์ก่อสร้างห้างพัทยา พบยาบ้าฉิมม่วง41ราย-ต่างดาวผิดกม.12ราย

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561, 17.39 น.

Tag: ตรวจสอบสารเสพติดไซต์ก่อสร้างห้างพัทยา ยาบ้า ฉิมม่วง ต่างดาว

f share Twitter Share

LINE เพิ่มเพื่อน

ไทยรัฐ ข่าว 5ดีโ พนันออนไลน์ ไทยรัฐทีวี ไฮไฟลด์ส์ กีฬา บันเทิง ดวง หอม นิตย



รวมครุ รถลื่นจนบุบ กระชากกระเป๋าสาว สารภาพหาเงินเสพยาบ้า

28 มี.ค. 2561 17:39 น.



จับเด็กเอ็นๆ
ชุกยาเคเข้าไทย

MGR ONLINE สกู๊ปพิเศษ

หน้าหลัก / กีฬา / สกู๊ปพิเศษ

"สารกระตุ้น-ยาเสพติด" กับนักชีวิตนักกีฬาต่าง

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2552 11:06 โดย: MGR Online

f share Twitter Share



ให้ออกกราชการ
6 ตำรวจ เสพยา

MThai.com MTHAI 18 มี.ค. 2562 เวลา 18:30 น.



13 คนบันเท็ง

ยาเสพติด ทำชีวิตเปลี่ยน!

ข้าพเจ้าขอลาสิกขา ท่านทั้งหลาย
จับพระสงฆ์เสพยาบ้า อ้างเครียดจัด / เกือบ / กับข่าว

ทำไมคนถึงใช้สารเสพติด

การรับมือกับความทุกข์ และแรงกดดัน

ต้องการการผ่อนคลาย
ต้องการความพึงพอใจที่ชีวิตปกติไม่มอบให้

การเจ็บป่วย

การเจ็บป่วยทางกาย การปวดเรื้อรัง
โรคทางจิตประสาท

ต้องการเพิ่มสมรรถภาพ ร่างกายหรือการทำงาน

ความอยากรู้อยากลอง

อยากรู้ว่าได้ผลเป็นอย่างไร
ได้ข้อมูลความเชื่อผิดๆ

สังคม

การเข้าถึงยาเสพติด
การยอมรับในสังคมและครอบครัว

กรรมพันธุ์ และการเลี้ยงดู

การติดยาเสพติดเป็นการเจ็บป่วยของ ร่างกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคม

ช่วงที่ต้องการทำงานหรือออกแรง





- มักใช้สารกระตุ้นประสาท เช่น
 - ยาบ้า แอมเฟตามีน และอนุพันธ์
 - นิโคติน
 - คาเฟอีน
 - กระเทียม





1. กลุ่มสารกระตุ้นประสาท

1.1 แอมเฟตามีนและอนุพันธ์

- Phenyl ethylamine stimulants
- Structure similar to dopamine and norepinephrine



1.1 แอมเฟตามีนและอนุพันธ์



นักเรียนหญิง น.5 หัวใจวายดับ คาดเพราะ
กินยาลดความอ้วน


© 30 พ.ค. 59
(12:33 น.)

นักเรียนหญิง น.5 เกิดหัวใจไม่ออกในโรงเรียน สง
รพ.หมอบี้มหัวใจอื้อชีวิตเฉยไม่สำเร็จ เพื่อนเหอกินยาลด
ความอ้วนเสี่ยงทางเลือดล้นเกินกว่า 2 เดือน

👤 144,821

👍 49,315

👤 14



ฉุทหนร "ยาระเบ็ดพุง" สวรบ 21 ช้อกดับ
คาคั่นอน


© 22 เม.ย. 59
(08:21 น.)

หญ้งโยคนส้งมจะเบ็ดพุงทงเพรภคพ้งลดความอ้วน สด
พ้ยเบ็ดยวีรคคพ้งนอเนนแก็บ 4 วัน ทวจะมคณมพ

👤 170,377

👍 57,113

👤 24



1.1 แอมเฟตามีนและอนุพันธ์ พิษเฉียบพลัน

- อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง
มีอาการเคลิ้มสุข สับสน กระวนกระวาย ประสาทหลอน
ชักและหมดสติได้
- อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ
อุณหภูมิร่างกายสูง
ชีพจรเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย
ความดันโลหิตสูง เลือดออกในสมอง เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด
เหงื่อออก
- อาการทางระบบกล้ามเนื้อ มีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง มีอาการลั่น

1.1 แอมเฟตามีนและอนุพันธ์ ผลระยะยาว

- สัมพันธ์กับการเกิดโรคจิต
- เส้นเลือดสมองตีบ การบาดเจ็บของเนื้อสมอง
- ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ (cardiomyopathy)
- โรคคลื่นหัวใจรั่ว และภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง

Psychoactive bath salts




1.2 กระเทียม



1.2 กระเทียม ผลเฉียบพลัน

- มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้รู้สึกตื่นตัว ลดความอยากอาหาร มีฤทธิ์ลดปวด
- อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง
มีอาการเคลิ้มสุข สับสน กระวนกระวาย ประสาทหลอน ชักและหมดสติได้
สามารถกดประสาทให้หมดสติ และหยุดหายใจได้
- อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ
อุณหภูมิร่างกายสูง ชีพจรเร็ว ความดันโลหิตสูง
- อาการทางระบบกล้ามเนื้อ มีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง มีอาการสั่น




2. กลุ่มสารหลอนประสาท

ช่วงที่ต้องการเน้นหนักการเน้นสารกลุ่มที่หลอนประสาท/มึนเมา

- กัญชา
- เห็ดเมา
- กาว
- แก๊สหัวเราะ
- แก้วไอ
- ยาแก้แพ้
- ยาลดเกร็ง/คลายกล้ามเนื้อ
- ยาต้านซึมเศร้า
- ketamine
- กลุ่มสารกระตุ้น ยาอี ยาไอซ์ โคเคน
- กลุ่มสารกดประสาท สุรา opioid

2.1 กัญชา



2.1 ผลจากกระทบจากการใช้กัญชาไม่เหมาะสม

- ปากคอแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน
- มึนเมา ประสาทหลอน หมดสติ
- สูญเสียความยับยั้งชั่งใจ บางรายมีอาการตื่นตระหนก
- ความดันโลหิตและชีพจรเปลี่ยนแปลง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ควบคุมกล้ามเนื้อได้ยาก อาจมีอาการเกร็ง สั่น หรือ กล้ามเนื้อกระตุก

2.1 ผลจากกระทบจากการใช้กัญชาไม่เหมาะสม

- โรคทางจิต เพิ่มขึ้น 3.9 เท่า
- การลงมือฆ่าตัวตาย เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า
- การติดกัญชา ร้อยละ 10 (ร้อยละ 17 ในวัยเรียน)
- ปัญหาการเรียนรู้ สมาธิ และความจำ
- สมองฝ่อ

Clin Toxicol (Phila). 2016;54(9):840-846
Br J Psychiatry. 2001;178:101.
Toxnet HSDB. NIH

CMAJ Open 2018. DOI:10.9778/cmajo.20180023
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6893937/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21749524/>
<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1206820109>

2.1 ผลจากกระทบจากการใช้กัญชาไม่เหมาะสม

- กลูกลมโป่งพอง
- เส้นเลือดสมองตีบ
- เส้นเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้น 5 เท่า
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- สัมพันธ์กับมะเร็งอัมฤต
- รบกวนระดับยาและผลของยาหลายชนิด
- อาจพบการทำงานของตับและไตผิดปกติ

Clin Toxicol (Phila). 2016;54(9):840-846
Br J Psychiatry. 2001;178:101.
Toxnet HSDB. NIH

CMAJ Open 2018. DOI:10.9778/cmajo.20180023
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6893937/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21749524/>
<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1206820109>



แซวร้อน! 2 เด็กชายเร่ร่อน 9-10 ขวบ สูญเสียจากกลางพิทยา เมินผู้ใหญ่เตือน อ้างพ่อเป็นทหาร ไม่กลัวโดนจับ

130K views • 8 months ago

👤 เด็กสายน้ำ

2 เด็กชายเร่ร่อนวัย 9 กับ 10 ขวบ สูญเสียจากกลางพิทยา เมินผู้ใหญ่เตือน 25 นาทีพูดให้พ่อแม่ฟัง... เจ้าบ่าวโหด! เข้าใจแล้ว...



รวม 3 นร.เข้ามามี "สูญเสีย-ขาดน้ำหอม" | สำนักข่าววันนิวส์

1.9K views • 6 months ago

👤 ข่าววันนิวส์

โลกเร่ร่อน ที่เจ้าตัวร้ายเข้าใจคือ "สำนักข่าววันนิวส์" เก็บเงินในกระเป๋าเงิน (วันนิวส์) คือความหมายที่สำคัญสำหรับวันนิวส์ ได้ลดละเลิกในการขาย...



เพจดังแฉ! อนาคตของชาติ นักเรียนชาย-หญิง มั่วสุมดูเด็ก

16K views • 5 months ago

👤 CH7HD News

น้องชายภาคเหนือ - เพจดังแฉนักเรียนชาย-หญิง มั่วสุมดูเด็ก รวมกลุ่มดูเด็กจากกลางวันแฉๆ คำตอบว่า นร.ชาติ นร....



เด็กเมืองชลวัย 14 ติดก็ถูกเขาหนัก โหมโหรีใส่ยาย จนไม่ให้เงินไปซื้อ

118K views • 4 months ago

👤 เด็กสายน้ำ

วานนี้ (20 มี.ค.) เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้าน ของทางฝั่งถนน บ้านหนองเขาตาโล หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.บางฉกรรจ์ จ....




เด็ก 16 พิการขาดสติ บุกจี้แม่ขอ 400 ก่อนนอนซบคืนโซวieso ดร.รุดหัวบ้นัด | ทบโดะขาว 11/11/65

100K views • 8 months ago

👤 AMARINTV : อมรินทร์ทีวี

เด็ก 16 พิการขาดสติ บุกจี้แม่ขอ 400 ก่อนนอนซบคืนโซวieso ดร.รุดหัวบ้นัด ตามไฟลัดโดะขาว 34 HD APP ออสดักโหดพิฆาตสังหารชีวิต...



เปิดชีวิตแสนเศร้าเด็กพิการขาดสติ... ก็ดีจาก ใช้ชีวิตกับหมาเพื่อนรัก ยายกให้โรงทูบโดะขาว 02/12/65

194K views • 8 months ago

👤 AMARINTV : อมรินทร์ทีวี

เปิดชีวิตแสนเศร้าเด็กพิการขาดสติ... ก็ดีจาก ใช้ชีวิตกับหมาเพื่อนรัก ยายกให้โรงทูบโดะขาว ตามไฟลัดโดะขาว 34 HD APP ออสดักโหดพิฆาตสังหารชีวิต...

พระเสวกัญญา อังรักษาเบาทวน | 27 พ.ย. 65 | คู่กัดสะบัดข่าว



มือสวาทองสงขรอีกแล้ว...เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย นั่งสูบบุหรี่ในกุฏิ ขณะที่เจ้าตัวออกมาชี้แจงว่า ที่สูบบุหรี่เพื่อรักษาโรคเบาทวน ...

YouTube · Thairath Online · 3 ธ.ค. 2565

www.youtube.com › watch

บุกจับพระเสวกัญญา ไอซ์ คาบุกี | 27-04-63 | ข่าวเย็นไทยรัฐ



ที่จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ย้ายปกครองชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด บุกเข้า จับกุมพระรูปหนึ่ง พร้อมของกลางกัญชาที่ปลูกไว้หลังกุฏิ ...

YouTube · Thairath Online · 27 เม.ย. 2563

www.youtube.com › watch

แซ่ร่วน! แก๊งพระสงฆ์ฟឹกัญชาคาบอง | เจาะข่าวค่ำ - YouTube



Open App. หลังเปิดเสรีเสวกัญชาได้ไม่นาน มีดลป...

YouTube · GMM25Thailand · 20 มี.ย. 2565

แพทย์เผยเคสเด็กป่วยจากกัญชา 6 คน ในช่วง 6 วัน อึ้งเด็ก 3
ขวบกับลูกที่กัญชา วัยรุ่น 16 หลอนกัญชาปาดคอตัวเอง

วันที่ลงข่าว 28 มิถุนายน 2565 เวลา 18:52 น. 4,372

18 มิ.ย. 15:00 น. 15:00 น.





หามส่งรพ. หมอมัดาสี ก็นบราวีผสมกัญชา | 03-01-66 | ข่าวเย็นไทยรัฐ

4.1K views • 7 months ago

Thairath Online

หมามัดาสี บราวี เป็นชาวขอนแก่นฯ มีพรหมโหดในเขตของกัญชา หรือมีส่วนผสมของกัญชา ขาวดำขาวดำเหมือนยาเขียวเมืองไทย ไม่กินจนเมา ...




พริตดีคู่ปลา ก็นบราวีนี้กัญชาบ๊อกรามส่ง รพ. | 23-07-65 | ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์

15K views • 1 year ago

Thairath Online

พริตดีคู่ปลา ก็นบราวีนี้กัญชา บ๊อกรามส่งโรงพยาบาล เกือบเอาชีวิตไปรอด คำพูดผู้ถูกจำคุกบราวีแล้วออกมาชี้แจง พริตดีกล่าวถึงคู่ก็นบราวีนี้กัญชา ...



พริตดีสาวโวย ถูกหลอกก็นบราวีผสมกัญชา ส่งรพ.ด่วน แพทย์มีอาจเกิดอันตราย เจียนพลัน



11K views • 5 years ago

เสียงเล่าขาน

เพลงหมอลำโหม่ง โหม่งเล่าเรื่องราวของพริตดีสาวคนหนึ่ง ที่โดนจับขังคุกในคุกบราวีแล้วออกมาชี้แจง แพทย์มีอาจเกิดอันตราย ...


2.2 ยาลดเกร็ง Trihexyphenidyl

- ยี่ห้อ Artane, Benzhexol, ACA
- ยาลดเกร็งในผู้ป่วยพาร์กินสัน
- ลดผลข้างเคียงเรื่องการเกร็งของยาต้านจิตเวชกลุ่มเก่า (haloperidol, chlorpromazine)



2.2 ยาลดเกร็ง Trihexyphenidyl

- ชี้อาการ B2, B5, A2, A5, เกา
- ต้านตัวรับ **acetylcholine** ในสมองและระบบประสาทอัตโนมัติ
มีนเมา ประสาทหลอน ปากคอแห้ง ชีพจรเร็ว ม่านตาขยาย
(คล้ายอาการจากการเสพยาฝิ่น)




2.3 ยาแก้แพ้ Antihistamine

- กลุ่มยาแก้แพ้ แก้คัน ลดน้ำมูก มีทั้งน้ำ เม็ด และแคปซูล
 - Promethazine (โปรเมทิดิล)
 - Chlorpheniramine (CPM คลอเฟนิรามีน)
 - Diphenhydramine (เบนาดริล)
 - กลุ่มที่ไม่ง่วงมาก: Cetirizine (เซอเทค, ฟาเทค), Fexofenadine



2.3 ยาแก้แพ้ Antihistamine

- ต้านฤทธิ์ histamine - ลดคัน ลดน้ำมูก ง่วงซึม
- ต้านตัวรับ acetylcholine ในสมองและระบบประสาทอัตโนมัติ
มีนเมา ประสาทหลอน ปากคอแห้ง ชีพจรเร็ว ม่านตาขยาย
(คล้ายอาการจากการเสพยาฝิ่น)
- ในขนาดสูงมากอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- รักษาตามอาการ



3. กลุ่มสารกดประสาท

ช่วงที่ต้องการพักผ่อนหรือผ่อนคลาย

- เลือกสารที่มีฤทธิ์ง่วงซึมเช่น
- ยากลุ่ม benzodiazepine
- ยากลุ่ม sympatholytic
- สารจีเอชบี (gamma hydroxybutyrate, GHB)
- สารในกลุ่ม opioid เช่น ทรามาดอล ยาแก้ไอโคเดอีน
- สุรา
- ในบางรายอาจใช้ยาต้านจิตเวช

หนุ่มหลับยาว ตื่นอีกที 1 ปี คือนู๋บนรถเข็น สรรภาพวัย ยา 20 เน็ด ไม่มีคนปลูก เนตส์รุ่นเก๋

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 - 21:18 น.

ข่าว

ยาเสี่ยสาว Alprazolam กับความเชื่อผิดๆ ชี้อยู่ไม่ได้มี ฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

18 พ.ค. 2565 เวลา 14:46 น. | 2.1k

เจาะลึก "เคนมผง" ที่มียาเสพติดมรณะ เม้า มัน เสพครั้ง
เดียวถึงตาย คร่า 7 ศพคืนเดียว

โดย PPTV Online เผยแพร่ 12 พ.ค. 2564 , 11:22 น. | 18.8k

แชร์ :



4. การใช้สารต่างกลุ่มร่วมกัน

เป็นยาที่ผสมขึ้นเองของนักเสพติดบางกลุ่ม
ทำให้มีอาการรุนแรงขึ้นและเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้น
ส่วนผสมของยา 4 อย่าง คือ
เฮโรอีน เกลาเม็น ไอซ์ และยานอนหลับ
ซัลโพรเซียม ซัลเฟม โคลนาซีแพม

ตัวยาที่อันตรายที่สุดคือเฮโรอีน และ
มีผลทำให้เสียชีวิตได้มากกว่า 10 เท่า

"เคนมผง" ระบาดหนัก


 @thairaidnews
  YouTube
  ว่างช่อง

โครกฏ 27

CDC Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7. Saving Lives. Protecting People™

Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)


Search 

Advanced Search






Changes in Opioid-Involved Overdose Deaths by Opioid Type and Presence of Benzodiazepines, Cocaine, and Methamphetamine — 25 States, July–December 2017 to January–June 2018



4. การใช้สารที่มีฤทธิ์ต่างกัน

- ทำให้เสริมฤทธิ์หรือมีอาการที่ต้องการเด่นขึ้น
- ลดฤทธิ์บางอย่างที่ไม่ต้องการ

4. การใช้สารที่มีฤทธิ์ต่างกัน

- ทำให้เสริมฤทธิ์หรือมีอาการที่ต้องการเด่นขึ้น
 - Cocaine + Heroin
 - มีชื่อเรียกการเสพแบบนี้ว่า speedball
 - การขับสารออกจากร่างกายช้าลง และอาจมีอาการเมาเคลิ้มไวขึ้น
 - เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก
- เนื่องจากช่วงแรกมี cocaine กระตุ้นประสาท ทำให้ฤทธิ์ง่วงซึม กดประสาทและการหายใจของ heroin ไม่ชัดเจน เมื่อ cocaine ซึ่งมีระยะเวลาออกฤทธิ์สั้นกว่าหมดฤทธิ์ ผลของ heroin จึงเด่นขึ้น ทำให้เกิดอาการโคม่า หยุดหายใจ

4. การใช้สารที่มีฤทธิ์ต่างกัน


- ทำให้เสริมฤทธิ์หรือมีอาการที่ต้องการเด่นขึ้น
 - Cocaine + Alcohol
 - เพิ่มการดูดซึม cocaine
มีผลให้ความดันโลหิตและชีพจรเพิ่มมากขึ้น
 - นอกจากนี้ยังเกิดปฏิกิริยาได้สารชื่อ cocaethylene ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารกระตุ้นประสาทเช่นเดียวกับ cocaine แต่จะอยู่ในร่างกายนานกว่า

4. การใช้สารที่มีฤทธิ์ต่างกัน

- ลดฤทธิ์บางอย่างที่ไม่ต้องการ
 - ใช้ยาต้านอาการทางจิต หรือยานอนหลับ ร่วมกับกลุ่มสารกระตุ้น
 - ใช้ยาลดความดันโลหิต ร่วมกับกลุ่มสารกระตุ้น
 - ใช้ยาต้านอาการทางจิต หรือยานอนหลับ ร่วมกับกลุ่มสารหลอนประสาท

5. อุปกรณ์บุหรีไฟฟ้า

บุหรีไฟฟ้า



สคบ. ชี้แจง 'บุหรี่ไฟฟ้า'

'ผู้ขาย' หรือ 'ผู้ให้บริการ' 'ผู้ครอบครอง' หรือ 'รับฝากใช้' 'ผู้นำเข้า'

จากผู้ที่ไม่เกิน 3 ปี
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ)

จากผู้ที่ไม่เกิน 5 ปี
ปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า
(พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ)

จากผู้ที่ไม่เกิน 10 ปี
ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

จากผู้ที่ไม่เกิน 10 ปี
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท (หรือทั้งจำทั้งปรับ)
(พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ)

Google

บุหรี่ไฟฟ้า

ค้นหา: 6,790,000 รายการ (0.34 วินาที)

<http://www.siampods.com>

siampods | จัดจำหน่ายขายบุหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร
จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า siampods ขายทอดตลาดในอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ครบวงจรในทีเดียว.
English: พอต ในตัวที่ - นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า Saliotic

<http://www.siampods.com/category/category-109148>

ขายบุหรี่ไฟฟ้า pod ราคาถูก | ส่งด่วน ทั่วประเทศ - siampods
SiamPods | ขายบุหรี่ไฟฟ้า (pod system) | ราคาถูก ส่งด่วน ทั่วประเทศ | | ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า

<https://www.podbkk.com>

podbkk: ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าและ pod system
10 พฤษภาคม 2565: recommendation บุหรี่ไฟฟ้า pod system ราคาถูก | ยังไม่เลิกทดลองแบบ |
pod bkk
บุหรี่ไฟฟ้า pod system ราคาถูก : นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า Saliotic : ขายบุหรี่ไฟฟ้า

รูปภาพสำหรับ บุหรี่ไฟฟ้า

pod stick pod system หนวดสูบ vocpod drag pod kit

ดูทั้งหมด

<https://pod69.com>

นำเข้ามาบุหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ราคาถูกที่สุด | POD69
POD69 เป็นร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า คอสมิก พอตไฟฟ้า ของแท้
ราคาถูกสามารถซื้อได้ผ่านหน้าเว็บและ Line ๒๕๕ : @pod69 (๕ @ภาษา)

facebook

กลุ่ม



บุหรืไฟฟ้า

กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 4.7 หมื่น คน · 10+ โพสต์ต่อวัน

เข้าร่วมกลุ่ม



บุหรืไฟฟ้า น้ายามหรืไฟฟ้า

กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 4 แสน คน · 1 โพสต์ต่อวัน

เข้าร่วมกลุ่ม



บุหรืไฟฟ้า

กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 1.5 หมื่น คน · 10+ โพสต์ต่อวัน

เข้าร่วมกลุ่ม

ผู้คน



บุหรื ไฟฟ้า

ผู้ติดตาม 1,094 คน · ทำงานที่ Facebook App

เพิ่มเป็นเพื่อน



บุหรื ไฟฟ้า.

ทำงานที่ มีผู้ติดตาม 2,896 คน

เพิ่มเป็นเพื่อน



บุหรื ไฟฟ้า

ทำงานที่ ทำงานอิสระ · อาศัยอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย · ผู้ติดตาม 10 คน

เพิ่มเป็นเพื่อน



https://www.youtube.com/watch?v=XeKLMcM8_

รายงานการวิจัย
ปรากฏการณ์เชิงสาเหตุและปัจจัยทำนายการใช้สารแอมเฟตามีนและไอซ์
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

โดย
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักการและเหตุผล

- การใช้สารสารแอมเฟตามีนและไอซ์ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้อย่าเสพติดทั้งสองชนิดจำนวนมาก แต่ การนำผลมาใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงนั้นอาจยังไม่ตรงกับสภาพปัญหาเนื่องจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากและรวดเร็ว ประกอบกับเกิดการระบาดของโรคโควิด19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบและมีการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างรวดเร็ว
- จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ทีมผู้วิจัยสนใจในการศึกษาการใช้สารแอมเฟตามีนและไอซ์ในสังคมยุคโควิดและห่วงปฏิกิริยาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสู่การกำหนดนโยบายที่แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องจะทำให้ผู้ติดสารเสพติดถูกแก้ไขปัญหาที่มาจากสาเหตุที่แท้จริง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปรากฏการณ์เชิงสาเหตุการเสพติดแอมเฟตามีนและไอซ์ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้สารแอมเฟตามีนและไอซ์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

รูปแบบการวิจัย

- การผสมวิธีทั้งวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบบลำดับ (Sequential) โดยเริ่มศึกษาเชิงคุณภาพก่อน ในระยะแรก หลังจากนั้นรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล นำผลที่ได้มาใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณในระยะที่สอง
- การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาปรากฏการณ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเสพติดแอมเฟตามีนและไอซ์ในประเทศไทย
- กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เสพติดแอมเฟตามีนและไอซ์ ทั้ง 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน 2. กลุ่มวัยทำงานที่สมัครใจบำบัดที่โรงพยาบาล และสมัครใจบำบัดตามกระบวนการยุติธรรม ในชุมชน ในสถานพินิจ และผู้ต้องขังคดีเสพติดแอมเฟตามีน โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview)
- ทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างใน 4 ภูมิภาค คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ภูมิภาคละ 3 จังหวัด รวม 12 จังหวัด จังหวัดละ 30 คน รวม 360 คน และเก็บข้อมูลจนอิ่มตัว

รูปแบบการวิจัย


- การวิจัยระยะที่ 2 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้สารแอมเฟตามีนและไอซ์ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เป็นวิจัยเชิงปริมาณ
- กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3,600 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
- กลุ่ม **Case** ได้แก่ ผู้เสพแอมเฟตามีนและไอซ์ที่เป็นเด็กและเยาวชนและวัยแรงงานที่สมัครใจบำบัดที่โรงพยาบาล และสมัครใจบำบัดตามกระบวนการยุติธรรม ในสถานพินิจและผู้ต้องขังคดีเสพยาเสพติดและไอซ์ จังหวัดละ 150 คน จำนวน 12 จังหวัด รวม 1,800 คน
- กลุ่ม **Control** ได้แก่ เด็กและเยาวชนทั่วไปและวัยแรงงานที่ไม่เสพยาเสพติดและไอซ์ จังหวัดละ 150 คน จำนวน 12 จังหวัด รวม 1,800 คน
- เครื่องมือได้แก่แบบสอบถาม


พื้นที่ศึกษา


- ภาคเหนือ
 - จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย
- ภาคกลาง
 - จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครปฐม
- ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ
 - จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครพนม
- ภาคใต้
 - จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการศึกษา

สาเหตุที่ใช้ยาบ้า








ผลการศึกษา

สาเหตุที่ใช้ไอซ์



ผลการศึกษาเชิงปริมาณ สาเหตุการเสพติด

ภาคเหนือ

สาเหตุการเสพติดสารแอมเฟตามีน (ยาบ้า)	จำนวน	ร้อยละ
1.เกิดจากเพื่อนชักชวนเสพยาบ้า	371	82.4
2.ทักทายปัจจุบันยาบ้าหาง่ายราคาถูก	362	80.4
3.ตัดสินใจมาเสพยาเพราะอยากรู้ยากลองด้วยตนเองไม่มีใครชวน	335	74.4
4.เพื่อการทำงานให้ได้งานมากๆ ลดการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน	318	70.7
5.ลดการง่วงนอน	286	63.6
6.อารมณ์ความรู้สึกหายไป	266	59.1
7.ในระหว่างที่อยู่อาศัยมีการใช้สารเสพติดอย่างแพร่หลาย	260	57.8
8.หลงผิดคิดว่าดี	256	56.9
9.อยากรู้รสชาติ	253	56.2
10.มีความเครียดจากปัญหาในครอบครัว	239	53.1

เชิงปริมาณ สาเหตุการเสพติด

ภาคกลาง

สาเหตุการเสพติดแอมเฟตามีน (ยาบ้า)	จำนวน	ร้อยละ
1. ทำหายปัจจุบันยาบ้าหาง่ายราคาถูก	382	84.9
2. เพื่อการทำงานให้ได้งานมากๆ ลดการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน	376	83.6
3. ลดการขังนอน	369	82.0
4. อารมณ์ความรู้สึกหายไป	333	74.0
5. ลดความเบื่อหน่ายในชีวิต	331	73.6
6. คนใกล้ตัวเลวทรามเสพติด	325	72.2
7. อยากรู้รสชาติ	317	70.4
8. ปัญหาชีวิตของตนเอง จากการท้อแท้ ความเสียใจ	320	71.1
9. มีความเครียดจากปัญหาในครอบครัว	313	69.6
10. ต้องการโลกส่วนตัวที่มีความสุข	301	66.9

เชิงปริมาณ สาเหตุการเสพติด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาเหตุการเสพติดแอมเฟตามีน (ยาบ้า)	จำนวน	ร้อยละ
1. ตัดสินใจมาเสพยาเพราะอยากรู้รสชาติลองด้วยตนเองไม่มีใครชวน	342	76.0
2. ลดความเครียด	310	68.9
3. ทำหายปัจจุบันยาบ้าหาง่ายราคาถูก	287	63.8
4. เกิดความคั่นอง และขาดสติยั้งคิด ทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นยาเสพติด	244	54.2
5. อารมณ์ความรู้สึกหายไป	231	51.3
6. หลงผิดคิดว่าดี	214	47.6
6. เพื่อการทำงานให้ได้งานมากๆ ลดการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน	214	47.6
7. ลดการขังนอน	213	47.3
8. เกิดจากเพื่อนชักชวน/เสพตามเพื่อน	206	45.8
9. ในระหว่างที่อุปค้ายมีการใช้สารเสพติดอย่างแพร่หลาย	205	45.6
10. ลดความเบื่อหน่ายในชีวิต	187	41.6

เชิงปริมาณ สาเหตุการเสพติด

ภาคใต้

สาเหตุการเสพติดสารแอมเฟตามีน (ยาบ้า)	จำนวน	ร้อยละ
1. ทำหายับจึงหันมาขายยาบ้าหาเงินค่าถูก	382	84.9
2. เพื่อการทำงานให้ได้งานมากๆ ลดการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน	376	83.6
3. ลดการขงนอน	369	82.0
4. อารมณ์ความรู้สึกพาไป	333	74.0
5. ลดความเบื่อหน่ายในชีวิต	331	73.6
6. คนใกล้ชิดเสพสารเสพติด	325	72.2
7. ปัญหาชีวิตของตนเอง จากการข้อแท้ ความเสียใจ	320	71.1
8. อยากรู้รสชาติ	317	70.4
9. มีความเครียดจากปัญหาในครอบครัว	313	69.6
10. ต้องการโลกส่วนตัวที่มีความสุข	301	66.9

เชิงปริมาณ สาเหตุการเสพติด

ภาคเหนือ

สาเหตุของการเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
1. ตัดสินใจมาเสพติดเพราะอยากรู้ยากลองด้วยตนเองไม่มีใครชวน	138	63.3
2. อยากรู้รสชาติ	122	56.0
3. เกิดจากเพื่อนชักชวน/เสพติดตามเพื่อน	110	50.5
4. หลงผิดคิดว่าดี	106	48.6
5. อารมณ์ความรู้สึกพาไป	100	45.9
6. ชอบเที่ยวสถานบันเทิง	87	39.9
7. ต้องการให้รู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอ	74	33.9
8. ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน	65	29.8
9. ต้องการโลกส่วนตัวที่มีความสุข	62	28.4
10. ในระแวกที่อยู่อาศัยมีการใช้ไอซ์อย่างแพร่หลาย	61	28.0

เชิงปริมาณ สาเหตุการเสพติด

ภาคกลาง

สาเหตุของการเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
1.อยากรู้รสชาติ	98	40.5
2.ชอบเที่ยวสถานบันเทิง	79	32.6
3.ต้องการโลกส่วนตัวที่มีความสุข	77	31.8
4.เกิดจากเพื่อนชักชวน/เสพติดตามเพื่อน	76	31.4
4.อารมณ์ความรู้สึกพาไป	76	31.4
5.ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน	74	30.6
6.คนใกล้ชิดเสพติด	70	28.9
7.อยากเคลิบเคลิ้ม	69	28.5
8.หลงผิดคิดว่าดี	66	27.3
9.เข้าถึงแหล่งจำหน่ายได้ง่าย	59	24.4
9.ต้องการให้รู้สึกดีในตัวอยู่เสมอ	59	24.4
10.การไม่สามารถเผชิญ/จัดการปัญหาและอารมณ์	58	24.0

เชิงปริมาณ สาเหตุการเสพติด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาเหตุของการเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
1.อยากรู้รสชาติ	150	56.2
2.ตัดสินใจมาเสพติดเพราะอยากรู้ อยากลองด้วยตนเองไม่มีใครชวน	129	48.3
3.หลงผิดคิดว่าดี	114	42.7
4.อารมณ์ความรู้สึกพาไป	76	28.5
5.เกิดจากเพื่อนชักชวน/เสพติดตามเพื่อน	66	24.7
6.ต้องการแก้ปัญหาสุขภาพที่เจ็บป่วย	58	8.6
7.ต้องการให้เกิดอารมณ์ดี บิน เช่น เล่นดนตรี	47	21.7
8.ต้องการยี่ดระยะเวลาไม่พิเศษพันธ์	46	17.2
9.เป็นผู้ขาย จึงเสพติด	44	16.5
10.ต้องการให้รู้สึกดีในตัวอยู่เสมอ	41	15.4

เชิงปริมาณ สาเหตุการเลเฟไอซ์ ภาคใต้

สาเหตุของการเลเฟไอซ์	จำนวน	ร้อยละ
1.อยากรู้รสชาติ	98	77.7
2.ชอบเที่ยวสถานที่บ้านเกิด	79	62.7
3.ต้องการให้หัวสมองโล่ง ขนาดในการคิด	79	62.7
4.ต้องการโลกส่วนตัวที่มีความสุข	77	61.11
5.เอารมณ์ความรู้สึกพาไป	76	60.3
6.เกิดจากเพื่อนชักชวน/เลเฟตามเพื่อน	76	60.3
7.ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน	74	58.7
8.คนใกล้ชิดเลเฟไอซ์	70	55.5
9.อยากเคลิบเคลิ้ม	69	54.76
10.หลงผิดคิดว่าดี	66	52.3

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด

ตัวแปร	n = 100	เคยใช้สารเสพติด		B	Wald	OR (95% CI)	P-value
		ไม่	ใช่				
เพศ							
ชาย	40 (41.1)	170 (41.5)	730 (57.5)	.627	8.576	1.391 (1.23-2.65)	0.003
หญิง	320 (88.5)	3130 (50.9)	1570 (49.1)				
อายุ							
15-20	183 (50.8)	683 (37.3)	1147 (62.7)	.907	57.048	2.478 (1.93-3.17)	<0.001
21-30	1270 (49.2)	1117 (40.1)	653 (39.9)				
การศึกษา							
ปว	327 (2.7)	46 (12.9)	24 (76.1)	1.968	20.968	7.164 (1.68-36.62)	<0.001
มศ	3508 (97.4)	1732 (49.4)	1776 (50.6)				
รายได้							
ไม่มี	498 (13.8)	358 (71.9)	140 (28.1)	1.232	86.096	3.960 (2.26-4.98)	<0.001
มี	3102 (86.2)	1440 (46.5)	1660 (53.5)				
ครอบครัว							
Single	631 (24.5)	562 (87.9)	77 (25.1)	.836	56.302	1.890 (1.36-2.57)	<0.001
Married	2719 (75.5)	1237 (45.5)	1482 (54.5)				
อาชีพ							
ไม่มี	1462 (40.6)	815 (55.7)	647 (44.3)	.806	26.321	4.714 (1.80-17.32)	.002
มี	2719 (75.5)	1237 (45.5)	1482 (54.5)				
เพื่อน							
ไม่มี	183 (5.5)	278 (62.9)	55 (30.1)	2.519	20.662	2.240 (1.64-3.06)	<0.001
มี	3417 (94.5)	3672 (48.9)	1745 (51.1)				
เพื่อนชักชวน							
ไม่	267 (7.4)	200 (74.9)	67 (25.1)	1.983	46.869	7.367 (4.31-12.82)	<0.001
มี	3233 (82.6)	1660 (48.9)	1733 (52.0)				

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด

ตัวแปร	n (%)	การใช้สารเสพติด		B	Wald	OR (95% CI)	P value
		ไม่	ใช่				
ปัจจัยด้านอายุ (ปี) จำแนกตามช่วงอายุ							
10-20	1193 (33.1)	908 (25.8)	885 (74.2)	1.490	39.280	4.437 (2.78-7.27)	<.001
21-30	2407 (66.9)	1452 (62.0)	915 (38.0)				
ปัจจัยด้านเพศ (ชาย/หญิง) จำแนกตามเพศ							
ชาย	1133 (31.5)	294 (25.9)	839 (74.1)	7.00	9.493	2.013 (1.29-3.14)	.002
หญิง	2467 (68.5)	1506 (61.0)	961 (39.0)				
ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส (มี/ไม่มี) จำแนกตามสถานภาพสมรส							
มี	1047 (29.1)	217 (20.7)	830 (79.3)	2.54	11.699	2.849 (1.63-3.83)	.002
ไม่มี	2553 (70.9)	1583 (62.0)	970 (38.0)				
ปัจจัยด้านอาชีพ (มี/ไม่มี) จำแนกตามอาชีพ							
มี	2222 (61.7)	1333 (60.0)	889 (40.0)	.596	9.234	1.815 (1.23-2.66)	.001
ไม่มี	1378 (38.3)	467 (33.9)	911 (66.1)				
ปัจจัยด้านรายได้ (มี/ไม่มี) จำแนกตามรายได้							
มี	1433 (39.8)	746 (53.5)	687 (47.9)	1.870	101.92	6.491 (4.51-9.33)	<.001
ไม่มี	2167 (60.2)	1054 (48.6)	1113 (51.4)				
ปัจจัยด้านทรัพย์สิน (มี/ไม่มี) จำแนกตามทรัพย์สิน							
มี	94 (2.6)	52 (55.3)	42 (44.7)	3.192	30.393	24.329 (7.82-75.68)	<.001
ไม่มี	3506 (97.4)	1748 (49.9)	1758 (50.1)				

ผลการศึกษา

- พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 10-20 ปี มีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป 1.891 เท่า (OR=1.891, 95% CI=1.23-2.89)
- กลุ่มตัวอย่างที่พักอาศัยบ้านตนเองมีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่พักอาศัยบ้านบุคคลอื่น 2.478 เท่า (OR=2.478, 95% CI=1.93-3.17)
- กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่มีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่ 7.160 เท่า (OR=7.160, 95% CI=3.08-16.62)
- กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.360 เท่า (OR=3.360, 95% CI=2.26-4.98)







ผลการศึกษา

- กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ออกกำลังกายมีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ออกกำลังกายเป็นประจำ 1.890 เท่า (OR=1.890, 95% CI=1.38-2.57)
- กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินมีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีปัญหาเรื่องภาระหนี้สิน 4.714 เท่า (OR=4.714, 95% CI=1.80-12.32)
- กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเลี้ยงดูในวัยเด็กแบบละเลยมีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเลี้ยงดูในวัยเด็กแบบเข้มงวด แบบอิสระ 2.240 เท่า (OR=2.240, 95% CI=1.64-3.04)
- กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยในระดับมากเกี่ยวกับการใช้ยาบ้า/ไอซ์ ทำให้หายเหนื่อยจากการทำงานมีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยในระดับน้อย 7.267 เท่า (OR=7.267, 95% CI=4.11-12.82)

ผลการศึกษา

- กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ว่ามีเพื่อนในชุมชนมีผู้จำหน่ายยาบ้า/ไอซ์ มีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่รับรู้ 1.815 เท่า (OR=1.815, 95% CI=1.23-2.66)
- กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้ว่ามีเพื่อนในชุมชนสามารถซื้อยาบ้า/ไอซ์ ได้ทุกเวลา มีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่รับรู้ 6.491 เท่า (OR=6.491, 95% CI=4.51-9.33)
- กลุ่มตัวอย่างที่ไปเที่ยวงานสังสรรค์ งานปาร์ตี้ตามสถานที่ต่างๆ เป็นประจำ มีการใช้ยาบ้า/ไอซ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย 24.329 เท่า (OR=24.329, 95% CI=7.82-75.68)

•



ขอบคุณครับ